

Bio Wake 9-9

INTERRUTTORE DI DORMIENZA

CARATTERISTICHE

BIO WAKE® 9-9 è un concime di sintesi a forte attività fitoregolatrice, **attivatore della crescita ed interruttore di dormienza**, da impiegarsi in agricoltura integrata su alcune colture arboree (ciliegio, kiwi, albicocco, melo, pero, vite, etc), dalla fase di pre-risveglio vegetativo (al bruno), fino anche alla raccolta.

Applicato su **KIWI, CILIEGIO, UVA DA TAVOLA, DRUPACEE, POMACEE, POMODORO, CARCIOFO, PISELLI, ORTICOLE, etc**, BIO WAKE® 810 stimola l'enzima ribulosio - 1,5 - bifosfatocarbossilasi - ossigenasi; grazie a ciò, le fasi fenologiche del germogliamento, della fioritura e della maturazione si svolgono in periodi più ristretti rispetto al non trattato.

EFFETTI & VANTAGGI

Le piante di Ciliegio, trattate con BIO WAKE®9-9 mostrano una uniformità di schiusura delle gemme e la riduzione della scalarità di fioritura sia lungo il ramo che su tutta la pianta; una riduzione dei fiori non fertili e dei problemi di impollinazione dovuti allo sfasamento dell'epoca di fioritura tipica delle specie ad impollinazione incrociata, anticipa e uniforma la fioritura e la maturazione, aumenta la resa e la qualità dei frutti, oltre a una uniformità di maturazione con conseguente riduzione dei passaggi di raccolta e dei relativi costi.

Per Albicocco, Pesco, Susino, Vite da tavola, Kiwi, etc l'impiego di BIO WAKE® 9-9 anticipa e uniforma la fioritura e la maturazione, aumenta la resa e la qualità dei frutti, uniforma la pezzatura dei frutti e dei grappoli.

INGREDIENTI: Urea (1) CAS 57-13-6; Acido fosforico (1) CAS 7664-38-2; CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

USO E DOSI DI IMPIEGIO:

TIPO DI COLTURA	AL BRUNO	FOGLIARE
● Ciliegio, Pesco, Albicocco	4 - 5 kg/ha	2 - 3 kg/ha
● Vite e Kiwi	3 - 5 kg/ha	2 - 3 kg/ha
● Drupacee e Pomacee	4 - 5 kg/ha	2 - 3 kg/ha
● Pomodoro e Carciofo	-	2 - 3 kg/ha
● Piselli e Ortive	-	2 - 3 kg/ha

Trattamenti al bruno, in funzione antidormienza:

Vite, Ciliegio, Kiwi, Drupacee, Pomacee, etc: 400 - 500 gr/hl (4-5 Kg/Ha). Si consiglia n.2 trattamenti distanziati di 15-20 giorni comunque prima della fioritura e distanti almeno 7 giorni da precedenti trattamenti con antiparassitari.

Trattamenti al verde (dopo la fioritura per le drupacee e il trapianto per le ortive) in funzione fitoregolatrice:

Vite, Ciliegio, Kiwi, Drupacee, Pomacee, Pomodoro e Ortive: 200-300 gr/hl (2-3 Kg/Ha). Si consiglia n.2 trattamenti distanziati di 15-20 giorni, comunque 20 giorni prima della maturazione e distanziati almeno 7 giorni da precedenti trattamenti con antiparassitari.

COMPOSIZIONE

TENORE DICHIARATI DI NUTRIENTI IN MASSA

● Azoto (N) totale	9%
● Azoto sotto forma ureica	9%
● Anidride fosforica (P_2O_5) totale	9%
● Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	9%

Peso netto: Kg 5

Fabbricante Spagro srl

Piazzale Biancamano, 8 - 20121 - Milano (MI)

☎ **+39 02 62033079** 🌐 **www.agrimag.it** ✉ **info@spagro.it**

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE: Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO: Le confezioni parzialmente usate devono essere chiuse bene. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie, conservare in ambiente fresco a temperatura compresa tra 6-25°C.



• **superconveniente**