



COLLIS®

FUNGICIDA ANTIOIDICO PER CUCURBITACEE E VITE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono 18,2 g di **Boscalid** (pari a 200 g/l) e 9,1 g di **Kresoxim-metile** (pari a 100 g/l)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)

CLASSIFICAZIONE



ATTENZIONE

REG. MIN. SALUTE

N° 12866
del 28-09-2006

CONFEZIONE

Flacone da 1 litro

IMBALLO

Cartone
- da 10 flaconi

CARATTERISTICHE

È il vero specialista dell'**Oidio**, grazie ai due principi attivi che lo compongono.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di impiegare **COLLIS®** nel periodo critico per l'**Oidio**, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione con sostanze attive a diverso meccanismo d'azione. Con alte pressioni della malattia è necessario usare la dose più alta e l'intervallo tra i trattamenti più breve. **COLLIS®** offre le migliori prestazioni sia in apertura dei trattamenti, sia quando la pressione di malattia comincia a ritenersi pericolosa. È un prodotto da utilizzare preventivamente, che possiede un'ottima attività stoppante.

AVVERTENZE

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha (es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella e da intendersi come minime.

Avvertenze: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (ml/hl)	DOSE (ml/ha)	INTERVALLO DI TRATTAMENTO (gg)	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CETRIOLO*	Oidio	40-50	400-500	7-10	3	3
COCOMERO* MELONE* ZUCCA*	Oidio	40-50	400-500	7-10	3	3
VITE	Oidio	30-40	300-400	10-14	3	35
ZUCCHINO*	Oidio	40-50	400-500	7-10	3	3

* PIENO CAMPO E SERRA

