

# Difcor

**DIFCOR**® è un fungicida sistemico contenente difenoconazolo il cui principio attivo appartiene alla famiglia chimica dei triazoli (meccanismo d'azione FRAC 3). Ha un ampio spettro di azione ed è efficace contro un gran numero di malattie fungine. Rapidamente assorbito dalle colture, si diffonde negli organi colpiti dal trattamento (ingegneria dei sistemi localizzati).

Fungicidi

#### Composizione:

Difenoconazolo puro 23,6% (250 g/L)

#### Formulazione:

Concentrato emulsionabile (EC)

#### N° di registrazione:

17112 del 17.04.2018

#### Indicazioni di pericolo:

##### PERICOLO

H302 - H304 - H319 - H373 - H410 - EUH401

#### Confezione:

L 1

#### Intervallo di sicurezza:

7 gg per pomodoro; 14 gg per pomacee e drupacee, carota, sedano rapa, rafano, topinambur, pastinaca, prezzemolo, salsefrica, rapa, rutabaga, bietola rossa, cavolfiori, broccoli ed altri cavoli ad infiorescenza, cavolo verde e cinese ed altri cavoli a foglia, sedano; 21 per vite, barbabietola, cicoria, indivia, cavoli a testa, cavoli di bruxelles; 56 gg per colza.



Colture	Avversità	Dose	Note
Vite (da vino e da tavola)	Oidio, Black rot, Brenner	0,12 L/ha	Massimo 2 applicazioni per anno. È consentita una terza applicazione per il controllo del Black Rot.
Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nashi	Ticchiolatura ( <i>Venturia</i> spp.)	0,015 L/hL	Massimo 3 applicazioni per anno.
Pesco, Nettarino, Albicocco	Monilia, Oidio	0,02 L/hL	Massimo 2 applicazioni per anno.
Susino, Giuggiolo	Monilia	0,02 L/hL	Massimo 3 applicazioni per anno.
Carota, Sedano Rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Salsefrica	Alternaria, Oidio	0,5 L/ha	Massimo 3 applicazioni per anno.
Rapa, Rutabaga	Alternaria, Micosferella	0,5 L/ha	Massimo 3 applicazioni per anno.
Barbabietola da zucchero e da foraggio	Ruggine	0,5 L/ha	Massimo 2 applicazioni per anno.
Bietola rossa	Ruggine	0,5 L/ha	Massimo 2 applicazioni per anno.
Cicoria, Indivia (inclusa Indivia Belga)	Ruggine, Alternaria, Oidio	0,5 L/ha	Massimo 1 applicazione per anno.
Asparago	Ruggine, Stemphylium	0,5 L/ha	Trattamenti dopo la raccolta dei turioni. Massimo 3 applicazioni per anno.
Cavolfiori, Broccoli ed altri Cavoli ad infiorescenza, Cavolo Verde, Cavolo Cinese ed altri Cavoli a foglia	Alternaria, Micosferella	0,5 L/ha	Massimo 3 applicazioni per anno.
Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles	Alternaria, Micosferella	0,5 L/ha	Massimo 3 applicazioni per anno.
Sedano	Septoria	0,5 L/ha	Massimo 3 applicazioni per anno.
Pomodoro	Alternaria, Sclerotinia, Botrite	0,5 L/ha	Massimo 3 applicazioni per anno.

Colture	Avversità	Dose	Note
<b>Leguminose da seme (erba Medica, Trifoglio, Veccia, Favino, ecc), in campo e serra</b>	Ruggine	0,5 L/ha	Massimo 3 applicazioni per anno.
<b>Colture da seme (Carota, Lattuga, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Cavoli, Spinacio, Rapa, Bietola rossa, Fagioli, Piselli, Cetriolo, Zucchini, Melone, Viola, Aster, Garofano, Crisantemo, Lupini, Piselli dolci, ecc) in campo e serra</b>	Ruggine, Stemphylum, Oidio, Septoria	0,5 L/ha	Massimo 2 applicazioni per anno.
<b>Colza</b>	Phoma, Alternaria, Sclerotinia	0,5 L/ha	Massimo 2 applicazioni per anno.
<b>Rosa</b>	Oidio, Ruggini, Ticchiolatura	0,1 L/hl	Massimo 1 applicazione per anno.
<b>Alberi ed Arbusti Ornamentali</b>	Oidio, Marciume Nero, Ruggine, Cercospora, Monilia, ecc.	0,5 L/ha	Massimo 2 applicazioni per anno.