

Lepiback

LEPIBACK è un insetticida che agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione. Per un'efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

Composizione:

Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki, ceppo PB-54 g. 16 (Potenza 32.000 UI/mg di formulato)

Formulazione:

Polvere bagnabile (WP)

N° di registrazione:

14549 del 26.03.2009

Indicazioni di pericolo:

EUH401

Confezione:

Kg 1

Intervallo di sicurezza:

3 gg

Insetticidi

Colture	Avversità	Dose	Note
Agrumi	Tignola degli agrumi (<i>Prays citri</i>) e tortricidi ricamatori (<i>Cacoecia rosana</i>)	35 - 125 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Vite	Tignole (<i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i>)	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 3 applicazioni.
Pomodoro (in campo e in serra)	Nottuidi (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.) e tignola del pomodoro (<i>Tuta absoluta</i>)	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve.
Peperone, Cetriolo, Cetriolino, Zucchini (in campo e serra) Lattughe ed altre Insalate (incluse le Brassicacee), Carciofo, Spinaci e simili (in campo)	Nottuidi (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 3 applicazioni.
Cavoli	Cavolaia (<i>Pieris brassicae</i>), Tignola (<i>Plutella xylostella</i>), Nottuidi (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 3 applicazioni.
Actinidia	Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>)	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Olivo	Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)	35 - 125 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Drupacee	Cidia (<i>Cydia molesta</i>), Tignola (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), Lepidotteri defogliatori (<i>Malacosoma neustria</i> , <i>Anarsia lineatella</i> , <i>Orgyia</i> spp., etc.), Tortricidi (<i>Archips rosanus</i>)	35 - 125 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Pomacee	Carpocapsa (<i>Carpocapsa pomonella</i>), Tignola (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), lepidotteri defogliatori (<i>Malacosoma neustria</i> , <i>Orgyia</i> spp., etc.), Tortricidi (<i>Archips rosanus</i> , <i>Archips podanus</i>)	35 - 125 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Fragola (in campo e in serra)	Nottuidi (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Fruttiferi a guscio	Tignola (<i>Anarsia lineatella</i>), Tortricidi (<i>Archips rosanus</i> , <i>Archips podanus</i>), Aglaope infausta	35 - 125 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Cotone	Nottuidi (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Plusia</i> spp.) e Verme rosso del cotone (<i>Pectinophora gossypiella</i>)	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 2 applicazioni.
Forestali	Lepidotteri defogliatori	35 - 125 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 3 applicazioni.
Floreali e Ornamentali	Lepidotteri defogliatori	50 - 200 g/hL	Alla comparsa delle prime larve. Max 3 applicazioni.