

Thiopron®



THIOPRON® è un fungicida a base di zolfo in formulazione liquida con specifici coadiuvanti che lo rendono estremamente resistente al dilavamento. Il calibro omogeneo e predefinito delle micelle, conferisce al prodotto elevata efficacia e selettività.

Fungicidi

Composizione:

Zolfo puro 57,3% (825 g/L)
(esente da selenio)

Formulazione:

Sospensione concentrata (SC)

N° di registrazione:

00013 del 16.03.1972

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE
H317 - EUH401

Confezione:

L 1 - 10 - 200 - 1000

Intervallo di sicurezza:

non previsto



® Marchio registrato UPL

Colture	Avversità	Dose	Note
Vite	Oidio	2-4 L/ha 4-8 L/ha 8-12 L/ha	In caso di bassa pressione della malattia. In situazioni mediamente gravi. In situazioni gravi o per trattamenti "eradicanti".
	Escoriosi	4-6 L/ha	Da gemma cotonosa a prime 3 foglie.
	Erinosi ed Acariosi	6-12 L/ha	Da gemma cotonosa a prime 3 foglie.
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio ed eriofidi (pre e post fioritura)	3-5 L/ha 5-9 L/ha	Con bassa pressione della malattia o in miscela con altri agrofarmaci. Con alta pressione della malattia.
	Ticchiolatura, Oidio, Eriofidi e Patina bianca (da frutto noce a pre raccolta)	3 L/ha 4-6 L/ha	Con bassa pressione della malattia o in miscela con altri agrofarmaci. Con alta pressione della malattia o per trattamenti eradicanti.
	Oidio (in post raccolta)	6-9 L/ha	Pre trattamenti estintivi.
	Nespolo	Oidio	3-4 L/ha
Drupacee (Pesco, Nettarino, Albicocco Ciliegio, Susino)	Oidio	3-6 L/ha 6-9 L/ha	Trattamenti preventivi. Trattamenti estintivi post raccolta.
	Bolla	6-9 L/ha	Trattamenti da inizio caduta foglie a bottoni rosa.
	Monilia	5-10 L/ha	Impiegare le dosi più alte ad inizio e fine fioritura.
	Cladosporiosi	3-6 L/ha	Dalla fase di scamicatura frutti 3-5 interventi ad intervalli di 7-10 giorni.
	Maculatura rossa dell'albicocco	2,5-5 L/ha	Dalla fase di scamicatura in previsione di pioggia.
Nocciolo	Oidio, Eriofidi	8-12 L/ha	
Mandorlo	Oidio	1-5 L/ha	
Agrumi	Oidio e Septoria	6-10 L/ha	Da formazione inflorescenza a sviluppo frutto.
Olivo	Oidio, Lebbra ed Occhio di Pavone	6-10 L/ha	
Pomodoro, Peperone, Melanzana	Oidio ed Acari	3-6 L/ha	
Patata	Oidio	3-6 L/ha	
Ortaggi a stelo, a radice, a foglia	Oidio	3-7,5 L/ha	
Ortaggi a bulbo, Legumi, Cavoli	Oidio	3-7,5 L/ha	



Thiopron®

Colture	Avversità	Dose	Note
Cucurbitacee	Oidio	3 - 5 L/ha	
Fragola	Oidio	3 - 7 L/ha	
Piccoli Frutti	Oidio	3 - 7 L/ha	
Cereali	Oidio	5 - 8 L/ha	
Colza, Ravizzone, Brassica Crenata	Oidio	3 - 6 L/ha	
Barbabietola da zucchero	Oidio e Cercospora	3 - 5 L/ha	In caso di bassa pressione del patogeno o in miscela con altri fungicidi.
		5 - 8 L/ha	In caso di elevata pressione del patogeno.
Soia	Oidio	5 L/ha	
Forestali, Ornamentali e Floreali	Oidio	2,5 - 5 L/ha	

Fungicidi