

# SATELITE

(Concentrato solubile)  
**ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA**  
 Meccanismo d'azione: HRAC G

Registrazione del Ministero della Salute n. 15712 del 01/03/2013

**Composizione**

<b>GLIFOSATE acido puro</b>	<b>g. 31,18 (=360 g/L)</b>
(da sale isopropilammonico)	
Coformulanti	<b>q.b. a g. 100</b>

**INDUSTRIAS AFRASA S.A.**  
 C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro  
 E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna  
 Tel. 0034 961321700

Contenuto:  
**100-200-250-500 mL**  
**1-2-5-10-20-25-50-200\* L**  
 Partita n°

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: ---**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

Stabilimento di produzione: **INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna**  
 Distribuito da: **Jebagro GmbH - Hanseatic Trade Center, Kehrwieler 11 - 20457 Hamburg (Germania) Tel +49 (0) 40 / 30 14 12**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art. 93, comma 1 e all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**

**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

**CARATTERISTICHE**

SATELITE è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti. Dopo alcuni giorni si ha ingiallimento e arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Culture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, noce, olivo.

Culture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo, actinidia e nocciolo.

Culture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Culture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.

Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo, girasole, cotone, colza, soia, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse; effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alla coltivazione: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili (esclusi parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

**DOSI D'IMPIEGO**

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.

Nel caso di associazioni floristiche adottare le dosi efficaci per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 L/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 L/100 litri d'acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità d'impiego raccomandate dal produttore.

Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

**Annuali e biennali**

1,5-4 L/ha: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium* spp. (Loietto), *Mercurialis* spp. (Mercorella), *Poa* spp. (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Calendula* spp. (Calendula), *Chenopodium* sp. (Farinaccio), *Orobanche* spp. (Succiamele), *Portulaca* spp. (Porcellana), *Raphanus* spp. (Ravanello selvatico), *Senecio* spp. (Senecio), *Sinapis* spp. (Senape), *Stellaria* spp. (Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica)

**Perenni**

4-5 L/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex* spp. (Carice), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Glyceria* spp. (Gliceria), *Hipericum* spp. (Erba San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris* spp. (Scagliola), *Rumex* spp. (Romice), *Sonchus* spp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico)

5-7 L/ha: *Alisma* spp. (Mestolaccio), *Asfodelus* spp. (Asfodelo), *Butomus* spp. (Fiorone), *Cyperus* spp. (Zigolo), *Ferula* spp. (Ferula), *Juncus* spp. (Giunco), *Nardus* spp. (Cervino), *Scirpus* spp. (Scirpo), *Sparganium* spp. (Sparganio), *Tussilago* spp. (Farfaraccio)

8-10 L/ha: *Agrostis* spp. (Cappellini), *Allium* spp. (Aglione), *Artemisia* spp. (Artemisia), *Arundo* spp. (Canna), *Cynodon* spp. (Gramigna), *Eragrostis* spp. (Panece), *Glechoma* spp. (Edera), *Oxalis* spp. (Acetosella), *Paspalum* spp. (Gramignone), *Phragmites* spp. (Cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (Felce), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rubus* spp. (Rovo), *Tipha* spp. (Tifa), *Urtica* spp. (Ortica)

10 L/ha: *Aristolochia* spp. (Aristolochia), *Clematis* spp. (Clematide), *Convolvulus* spp. (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica)

**Arbusti**

4-6 L/ha: *Acer* spp. (Acer), *Fraxinus* spp. (Frassino), *Genista* spp. (Ginestra), *Salix* spp. (Salice), *Sambucus* spp. (Sambuco), *Vaccinium* spp. (Mirtillo)

10 L/ha: *Calluna* spp. (Grecchia), *Cistus* spp. (Cisto), *Erica* spp. (Erica), *Lonicera* spp. (Caprifoglio).

**OLIVO: Il prodotto può essere impiegato per il diserbo dell'olivo (preparazione delle piazzole) per il controllo delle infestanti sopra indicate. Dose massima di impiego: 6 litri/ha di prodotto (equivalenti a 2,16 kg/ha di principio attivo).**

**MODALITA' D'IMPIEGO**

Il prodotto va impiegato alla dose stabilita con volumi di 200-500 l/ha di acqua, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (massimo 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva.

Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Non effettuare più di 2 trattamenti per stagione.

**Avvertenze:** Se dopo il trattamento, entro un massimo di 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

**COMPATIBILITÀ**

**Avvertenze:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ** - Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se applicato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

**Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.**

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

**DA NON VENDERSI SFUSO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

\*L'utilizzo della taglia da 200L è consentito esclusivamente impiegando un sistema di trasferimento chiuso, omologato e adatto alla sostanza da trasferire.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# SATELITE

(Concentrato solubile)  
ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA  
Meccanismo d'azione: HRAC G

Registrazione del Ministero della Salute n. 15712 del 01/03/2013

## Composizione

GLIFOSATE acido puro	g. 31,18 (=360 g/L)
(da sale isopropilammnico)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

Contenuto: 100 mL

## INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53  
Pol. Ind. Fuente del Jarro  
E-46988 Paterna (Valencia) Spagna  
Tel. 0034 961321700  
Partita n°

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

**REAZIONE:** ---

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimento di produzione: **INDUSTRIAS AFRASA S.A.**

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da **Jebagro GmbH**

Hanseatic Trade Center - Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania) Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE**  
**DISPERSO NELL'AMBIENTE**