

OPTIX® R DISPERSS®

OPTIX® R DISPERSS® associa alla prolungata azione di copertura dell'idrossisolfato di rame la sistemica del fosetil-Al in grado di assicurare la protezione della nuova vegetazione e delle femmine della vite. La spiccata sinergia dei principi attivi conferisce al prodotto azione antisporulante su "macchie d'olio" di peronospora. Le caratteristiche tipiche dell'idrossisolfato di rame (brocantite) assicurano una selettività elevata, mentre la formulazione brevettata DISPERSS® permette un'eccellente dispersione ed un'agevole manipolazione.

COMPOSIZIONE Rame metallo puro 15% (da solfato tribasico)
Fosetyl-aluminium* puro 20%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg per vite; 20 gg per pomodoro, patata; 15 gg per melone, cocomero, cetriolo, lattughe e insalate; 14 gg per agrumi.

N° DI REGISTRAZIONE 13152 del 01/03/2006

CONFEZIONE kg 1 - 10

INDICAZIONI DI PERICOLO H318 - H410 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (kg/ha)	DOSE (g/hL)	NOTE
 Vite da vino e da tavola	Peronospora, Batteriosi**	4 - 6	400 - 600	Applicare dalla ripresa vegetativa (inizio germogliamento) con intervallo minimo di 10 giorni. Massimo 6 applicazioni all'anno. 1 applicazione in primavera. 1 - 2 applicazioni in autunno prima della raccolta con un intervallo minimo di 21 giorni. 1 applicazione in inverno prima della ripresa vegetativa. Massimo 4 applicazioni l'anno.
 Agrumi	Allupatura, Gommosi, Batteriosi**	5 - 6	500 - 600	
 Pomodoro (in campo e serra)	Peronospora, Batteriosi**	4 - 6	400 - 500	Trattamenti preventivi con intervallo minimo di 8 giorni. Massimo 3 applicazioni l'anno.
 Patata (in campo)	Peronospora, Batteriosi**	4 - 5	400 - 500	Trattamenti preventivi con intervallo minimo di 8 giorni. Massimo 4 applicazioni l'anno.
 Melone, Cocomero, Cetriolo (in campo e serra)	Peronospora, Batteriosi**	4 - 5	400 - 500	Trattamenti preventivi con intervallo minimo di 8 giorni. Massimo 3 applicazioni l'anno.
 Lattughe e Insalate (in campo e serra)	Peronospora, Batteriosi**	4 - 5	400 - 500	Trattamenti preventivi con intervallo minimo di 8 giorni. Massimo 2 applicazioni l'anno.

** = attività collaterale del rame

- Elevata selettività
- Dose di rame in linea con le nuove esigenze tecnico-normative
- Elevata qualità formulativa

