



DELTAGRI® è un insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

COMPOSIZIONE Deltametrina pura g 2,8 (25 g/L)

FORMULAZIONE Concentrato emulsionabile

INTERVALLO DI SICUREZZA 30 gg per agrumi, frutta a guscio, mais, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola da zucchero; 14 gg per erba medica; 7 gg per pomacee, drupacee, vite, olivo, patata, cavoli (eccetto cavolo cinese, cavolo riccio e cavolo rapa), cavolfiore, broccoli, pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava, aglio, cipolla, porro, tabacco, bietola rossa, lattuga; 3 gg per fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, cocomero, carciofo, prezzemolo, foglie di sedano, rucola.

N° DI REGISTRAZIONE 15537 del 20.01.2014

CONFEZIONE L 1

INDICAZIONI DI PERICOLO **PERICOLO**
H226 - H302 - H304 - H315
H318 - H336 - H410 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	NOTE
 Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo, Arancio Amaro)	Afidi (<i>Myzus persicae</i>)	30-50	
	Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>), Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	50	
 Frutta a guscio (Mandorlo, Noce, Castagno, Pistacchio, Nocciolo)	Afidi (<i>Hyalopterus spp.</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>)	30	
	Cydia (<i>Laspeyresia</i>) pomonella, Cydia (<i>Laspeyresia</i>) splendana, Tignola orientale (<i>Cydia molesta</i>)	50	
	Vespa dei semi del pistacchio (<i>Eurytoma plotnicovi</i>)	50	
 Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Cydia (<i>Laspeyresia</i>) pomonella, Psilla del melo (<i>Psylla mali</i>), Afidi (<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis plantaginea</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>), Tignola orientale (<i>Cydia molesta</i>)	30 - 50	
	Ricamatori (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>)	35	
	Psilla del pero (<i>Psylla pyri</i>)	50	
 Drupacee (Pesco, Nettare, Albicocco, Susino, Ciliegio)	Ricamatori (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>), Anarsia lineatella	35	
	Mosca delle ciliegie (<i>Rhagoletis cerasi</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>), Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	40 - 50	
	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	50	
	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus cerasi</i> , <i>Hyalopterus pruni</i>), Cydia (<i>Laspeyresia</i>) funebrana, Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i> Newmann), Tignola orientale (<i>Cydia molesta</i>)	30 - 50	
 Vite (da tavola e da vino)	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>)	50 50 - 70	1° generazione. 2° e 3° generazione.
	Tignola (<i>Clysis ambiguella</i>), Scaphoideus titanus, Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>)	50 - 70	
	<i>Empoasca spp.</i>	50	
	Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i> Newmann), Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	30 - 50	
 Fragola (in campo e in serra)	Afidi (<i>Aphis spp.</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>), Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	50	

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/ha)	NOTE
 Olivo	Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>)	50	
	Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)	50	
	<i>Euphyllura</i> spp., Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>), Sputacchina (<i>Philaenus spumarius</i>)	30 - 50	
	Tignola (<i>Prays oleae</i>)	30 50	Gen. antofaga. Gen. carposfaga.
 Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo)	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	
	Cimice (<i>Nezara viridula</i>)	30	
	Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>),	300 - 500 mL/ha	
 Cipolla, Porro, Aglio	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>), Nottue (<i>Agrotis</i> spp.)	300 - 500 mL/ha	
	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	
 Peperone (in serra)	Cimice (<i>Nezara viridula</i>)	30	
	Mosca bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	70	
	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	50	
 Pomodoro, Melanzana (in serra)	Cimice (<i>Nezara viridula</i>)	30	
	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Afidi (<i>Aphis</i> spp., <i>Hyperomyzus lactucae</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>),	300 - 500 mL/ha	
 Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Cocomero (in campo)	Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>),	300 - 500 mL/ha	
	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Afidi (<i>Aphis</i> spp., <i>Hyperomyzus lactucae</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>),	300 - 500 mL/ha	
 Cavoli (eccetto Cavolo Cinese, Cavolo Riccio e Cavolo Rapa), Cavolfiore, Broccoli	Cavolaia (<i>Pieris</i> spp.), Nottue fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Plusia gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	300 - 500 mL/ha	
	Plutella xylostella	500 mL/ha	
 Lattuga (in campo)	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i>), Afidi (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Aphis</i> spp.)	50	
	Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>),	300 - 500 mL/ha	
 Prezzemolo, Foglie di Sedano, Rucola	Afidi (<i>Aphis</i> spp.), Nottue fogliari (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Mamestra</i> spp., <i>Chrysodeixis chalcites</i>)	50	
	Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	300 - 500 mL/ha	
 Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis</i> spp.), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>),	300 - 500 mL/ha	
	Afide (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), <i>Sitona</i> spp.	250 mL/ha	
 Pisello	Afide nero (<i>Aphis fabae</i>), Tignola (<i>Laspeyresia nigricana</i>), Tripide (<i>Thrips angusticeps</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	300 - 500 mL/ha	

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/ha)	NOTE
 Carciofo	<i>Cassida sp.</i>	500 mL/ha	
	Nottue fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i>), Afidi (<i>Anuraphis cardui</i> , <i>Myzus persicae</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>)	300 - 500 mL/ha	
 Patata	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	500 mL/ha	
	Nottue fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i>), Tignola della patata (<i>Phthorimaea operculella</i>)	300 - 500 mL/ha	
 Cotone (per uso tessile)	Tignola (<i>Pectinophora gossypiella</i>), Nottua (<i>Helicoverpa armigera</i>)	500 - 700 mL/ha	
	<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Empoasca spp.</i>	500 mL/ha	
	<i>Spodoptera spp.</i> , afidi (<i>Aphis gossypii</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	300 - 500 mL/ha	
 Tabacco	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	300 - 500 mL/ha	
 Barbabietola da Zucchero, Bietola Rossa	Afidi (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Mosca (<i>Pegomya spp.</i>), Altica (<i>Chaetocnema tibialis</i>), Nottue (<i>Agrotis spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>)	300 - 500 mL/ha	
	<i>Cassida (Cassida nebulosa)</i>	500 mL/ha	
 Mais	Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Sesamia (<i>Sesamia nonagroides</i>), Nottue (<i>Agrotis spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Helicoverpa armigera</i>), Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>), Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorfa halys</i>)	300 - 500 mL/ha	
	Diabrotica virgifera	500 mL/ha	
 Frumento, Orzo, Segale, Avena	Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>), <i>Agrotis spp.</i>	300 - 500 mL/ha	
 Erba medica	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Apion pisi</i>), <i>Hypera postica</i>	250 mL/ha	
 Ornamentali (in campo e in serra)	Afidi (<i>Myzus spp.</i>), Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	50	
	Mosca bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>),	70	
	Lepidotteri (<i>Archips spp.</i> , <i>Adoxophyes spp.</i> , <i>Pandemis spp.</i>)	35	

- Agisce per contatto e ingestione ed è indicato per il controllo di afidi, lepidotteri, aleurodidi, coleotteri e tripidi delle principali colture orticole, frutticole ed estensive/industriali

- Ampia etichetta

- Elevata attività abbattente

