

SHENZI 200 SC



SHENZI 200 SC è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, mais, mais dolce e per la lotta alla dorifora della patata.

COMPOSIZIONE Chlorantraniliprole 200 g/L

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg vite da tavola; 7 gg per mai e mais dolce; 14 gg per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, patata; 21 gg per noce, castagno, mandorlo; 30 gg per vite da vino.

N° DI REGISTRAZIONE 18585 del 08.03.2024

CONFEZIONE L 0,3 - 1

INDICAZIONI DI PERICOLO **ATTENZIONE**
H410
EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	DOSE (mL/ha)	NOTE
 Melo, Pero	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Argyrotaenia pulchellana</i> , <i>Pandemis spp</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Cydia molesta</i> e <i>Popillia japonica</i>	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni anno
	<i>Phyllonorychter blancardella</i> , <i>Phyllonorychter corylifoliella</i> , <i>Leucoptera scitella</i>	16 - 18	160 - 270	Massimo 2 applicazioni anno
 Pesce, Albicocco, Nettare, Susino	<i>Cydia molesta</i> , <i>Argyrotaenia pulchellana</i> , <i>Cydia funebrana</i> , <i>Operophtera brumata</i> , <i>Popillia japonica</i>	18 - 20	160 - 300	Massimo 2 applicazioni anno
	<i>A. lineatella</i>	16 - 20	160 - 300	
 Vite (da vino e da tavola)	<i>E. ambiguella</i> , <i>L. botrana</i> , <i>A. pulchellana</i> , <i>P. Vitigenella</i> , <i>C. gnidiella</i> , <i>Popillia japonica</i>	15 - 18	150 - 270 su vite da vino 150 - 216 su vite da tavola	Massimo 1 applicazione all'anno Massimo 2 applicazioni all'anno
 Noce	<i>Cydia pomonella</i>	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni all'anno
 Castagno (in coltura allevata)	<i>C. pomonella</i> , <i>C. fagiglandana</i> , <i>C. elephas</i>	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni all'anno
 Mandorlo	<i>A. lineatella</i>	18 - 20	180 - 300	Massimo 2 applicazioni all'anno
 Arancio, Limone, Mandarino	<i>P. Citrella</i>	10 - 15	50 - 75	Massimo 2 applicazioni all'anno Applicare solo su colture non ancora in produzione
 Patata	<i>I leptonotarsa decemlineata</i>	-	50 - 60	Massimo 2 applicazioni all'anno
	<i>P. operculella</i>	-	125 - 175	
 Mais e Mais dolce	<i>O. nubilalis</i> e lepidotteri notturni (<i>H. armigera</i> , <i>S. exigua</i> , <i>S. littoralis</i> , <i>Sesamia spp</i>) <i>Popillia japonica</i>	-	100 - 150	Massimo 2 applicazioni all'anno

- Attività multistadio ovidica, ovi-larvicida e larvicida
- Elevata efficacia
- Ottima persistenza d'azione
- Alta resistenza al dilavamento

